



# ATA Aarde A + B Kweekschema

## voor 100 ltr. voedingsvat



T +31 (0)73 - 522 32 56  
F +31 (0)73 - 521 32 59

www.atami.com • info@atami.com

### WEEK 1

LET OP !!! EC waarde gericht op de witte soorten.  
Voor de andere soorten gebruikt u de hogere EC waardes \*( ).

- Voedingsvat vol laten lopen met water van +/- 20 graden.
- 100 ml. Aarde-A voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- 100 ml. Aarde-B voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- De waarde van het water in het voedingsvat is dan +/- EC 1,2 \*( +/- EC 1,2).
  - Meet het voedingswater met een pH-meter voor de zuurwaarde.
- Deze zuurwaarde moet een pH hebben van tussen de 5,6-6,0 (optimale pH 5,8).
  - pH boven deze waarde pH- oplossing toevoegen.
  - pH onder deze waarde pH+ oplossing toevoegen.
  - Voedingswater in het vat goed laten circuleren.
- 100 ml. B'cuzz Wortelstimulator + 200 ml. Atazyme + 10 ml. Ataclean toevoegen.
  - Voedingswater klaar om aan de planten te geven.
  - Voedingsbeurten tussen 4-8 x per dag, uitdrain +/- 40 %.

### WEEK 2

LET OP !!! EC waarde gericht op de witte soorten.  
Voor de andere soorten gebruikt u de hogere EC waardes \*( ).

- Voedingsvat vol laten lopen met water van +/- 20 graden.
- 150 ml. Aarde-A voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- 150 ml. Aarde-B voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- De waarde van het water in het voedingsvat is dan +/- EC 1,3 \*( +/- EC 1,5).
  - Meet het voedingswater met een pH meter voor de zuurwaarde.
- Deze zuurwaarde moet een pH hebben tussen de 5,6-6,0 (optimale pH 5,8 ).
  - pH boven deze waarde pH- oplossing toevoegen.
  - pH onder deze waarde pH+ oplossing toevoegen.
  - Voedingswater in het vat goed laten circuleren.
- 100 ml. B'cuzz Wortelstimulator + 200 ml. Atazyme + 10 ml. Ataclean toevoegen.
  - Voedingswater klaar om aan de planten te geven.
  - Voedingsbeurten tussen 4-8 x per dag, uitdrain +/- 40 %.

### WEEK 3

LET OP !!! EC waarde gericht op de witte soorten.  
Voor de andere soorten gebruikt u de hogere EC waardes \*( ).

- Voedingsvat vol laten lopen met water van +/- 20 graden.
- 200 ml. Aarde-A voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- 200 ml. Aarde-B voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- De waarde van het water in het voedingsvat is dan +/- EC 1,4 \*( +/- EC 1,8).
  - Meet het voedingswater met een pH meter voor de zuurwaarde.
- Deze zuurwaarde moet een pH hebben tussen de 5,6-6,0 (optimale pH 5,8).
  - pH boven deze waarde pH- oplossing toevoegen.
  - pH onder deze waarde pH+ oplossing toevoegen.
  - Voedingswater in het vat goed laten circuleren.
- 200 ml. Atazyme + 100 ml. Ata XL + 10 ml. Ataclean toevoegen.
  - Voedingswater klaar om aan de planten te geven.
  - Voedingsbeurten tussen 4-8 x per dag, uitdrain +/- 40 %.

### WEEK 4

LET OP !!! EC waarde gericht op de witte soorten.  
Voor de andere soorten gebruikt u de hogere EC waardes \*( ).

- Voedingsvat vol laten lopen met water van +/- 20 graden.
- 200 ml. Aarde-A voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- 200 ml. Aarde-B voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- De waarde van het water in het voedingsvat is dan +/- EC 1,4 \*( +/- EC 1,8).
  - Meet het voedingswater met een pH meter voor de zuurwaarde.
- Deze zuurwaarde moet een pH hebben tussen de 5,6-6,0 (optimale pH 5,8).
  - pH boven deze waarde pH- oplossing toevoegen.
  - pH onder deze waarde pH+ oplossing toevoegen.
  - Voedingswater in het vat goed laten circuleren.
- 200 ml. Atazyme + 100 ml. Ata XL + 10 ml. Ataclean toevoegen.
  - Voedingswater klaar om aan de planten te geven.
  - Voedingsbeurten tussen 4-8 x per dag, uitdrain +/- 40 %.

### WEEK 5

LET OP !!! EC waarde gericht op de witte soorten.  
Voor de andere soorten gebruikt u de hogere EC waardes \*( ).

- Voedingsvat vol laten lopen met water van +/- 20 graden.
- 300 ml. Aarde-A voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- 300 ml. Aarde-B voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- De waarde van het water in het voedingsvat is dan +/- EC 1,6 \*( +/- EC 1,9).
  - Meet het voedingswater met een pH meter voor de zuurwaarde.
- Deze zuurwaarde moet een pH hebben tussen de 5,6-6,0 (optimale pH 5,8).
  - pH boven deze waarde pH- oplossing toevoegen.
  - pH onder deze waarde pH+ oplossing toevoegen.
  - Voedingswater in het vat goed laten circuleren.
- 200 ml. Atazyme + 100 ml. Ata XL + 150 ml. PK 13-14 + 10 ml. Ataclean toevoegen.
  - Voedingswater klaar om aan de planten te geven.
  - Voedingsbeurten tussen 4-8 x per dag, uitdrain +/- 40 %.

### WEEK 6

LET OP !!! EC waarde gericht op de witte soorten.  
Voor de andere soorten gebruikt u de hogere EC waardes \*( ).

- Voedingsvat vol laten lopen met water van +/- 20 graden.
- 300 ml. Aarde-A voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- 300 ml. Aarde-B voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- De waarde van het water in het voedingsvat is dan +/- EC 1,7 \*( +/- EC 2,1).
  - Meet het voedingswater met een pH meter voor de zuurwaarde.
- Zuurwaarde moet een pH hebben tussen de 5,6-6,0 (optimale pH 5,8)
  - pH boven deze waarde pH- oplossing toevoegen.
  - pH onder deze waarde pH+ oplossing toevoegen.
  - Voedingswater in het vat goed laten circuleren.
- 200 ml. Atazyme + 100 ml. Ata XL + 150 ml. PK 13-14 + 10 ml. Ataclean toevoegen.
  - Voedingswater klaar om aan de planten te geven.
  - Voedingsbeurten tussen 4-8 x per dag, uitdrain +/- 40 %.

### WEEK 7

LET OP !!! EC waarde gericht op de witte soorten.  
Voor de andere soorten gebruikt u de hogere EC waardes \*( ).

- Voedingsvat vol laten lopen met water van +/- 20 graden.
- 350 ml. Aarde-A voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- 350 ml. Aarde-B voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- De waarde van het water in het vat is dan +/- EC 1,8 \*( +/- EC 2,2).
  - Meet het voedingswater met een pH meter voor de zuurwaarde.
- Deze zuurwaarde moet een pH hebben tussen de 5,6-6,0 (optimale pH 5,8).
  - pH boven deze waarde pH- oplossing toevoegen.
  - pH onder deze waarde pH+ oplossing toevoegen.
  - Voedingswater in het vat goed laten circuleren.
- 200 ml. Atazyme + 100 ml. Ata XL + 150 ml. PK 13-14 + 10 ml. Ataclean toevoegen.
  - Voedingswater klaar om aan de planten te geven.
  - Voedingsbeurten tussen 4-8 x per dag, uitdrain +/- 40 %.

### WEEK 8

LET OP !!! EC waarde gericht op de witte soorten.  
Voor de andere soorten gebruikt u de hogere EC waardes \*( ).

- Voedingsvat vol laten lopen met water van +/- 20 graden.
- 350 ml. Aarde-A voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- 350 ml. Aarde-B voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- De waarde van het water in het voedingsvat is dan +/- EC 1,9 \*( +/- EC 2,3).
  - Meet het voedingswater met een pH meter voor de zuurwaarde.
- Zuurwaarde moet een pH hebben tussen de 5,6-6,0 (optimale pH 5,8).
  - pH boven deze waarde pH- oplossing toevoegen.
  - pH onder deze waarde pH+ oplossing toevoegen.
  - Voedingswater in het vat goed circuleren.
- 200 ml. Atazyme + 100 ml. Ata XL + 150 ml. PK 13-14 + 10 ml. Ataclean toevoegen.
  - Voedingswater klaar om aan de planten te geven.
  - Voedingsbeurten tussen 4-8 x per dag, uitdrain +/- 40 %.

### WEEK 9

LET OP !!! EC waarde gericht op de witte soorten.  
Voor de andere soorten gebruikt u de hogere EC waardes \*( ).

- Voedingsvat vol laten lopen met water van +/- 20 graden.
- 350 ml. Aarde-A voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- 350 ml. Aarde-B voeding toedienen, daarna goed circuleren.
- De waarde van het water in het voedingsvat is dan +/- EC 2,0 \*( +/- EC 2,3).
  - Meet het voedingswater met een pH meter voor de zuurwaarde.
- Zuurwaarde moet een pH hebben tussen de 5,6-6,0 (optimale pH 5,8).
  - pH boven deze waarde pH- oplossing toevoegen.
  - pH onder deze waarde pH+ oplossing toevoegen.
  - Voedingswater in het vat goed circuleren.
- 200 ml. Atazyme + 100 ml. Ata XL + 150 ml. PK 13-14 + 10 ml. Ataclean toevoegen.
  - Voedingswater klaar om aan de planten te geven.
  - Voedingsbeurten tussen 4-8 x per dag, uitdrain +/- 40 %.

### Opmerkingen

Indien u gebruik wilt maken van de B'cuzz Blossom Builder Tabzz verlaag dan de dosering van de voeding tot EC 1,2-1,6 en vul deze aan met 1 à 2 Tabzz in de laatste drie weken van de bloei voor de week van spoelen met water. Gebruik geen PK 13-14.

### WEEK 10

- Spoelen met water.

# ATA Aarde A + B Kweekschema

voor 100 ltr. voedingsvat

## Benodigheden:

**ATAMI**

T +31 (0)73 - 522 32 56

F +31 (0)73 - 521 32 59

[www.atami.com](http://www.atami.com)

[info@atami.com](mailto:info@atami.com)

### Wortel Stimulator



### Voeding



### Atazyme



### Ata XL



### PK 13-14



### Ataclean



### Opmerkingen

Indien u gebruik wilt maken van de B'cuzz Blossom Builder Tabzz verlaag dan de dosering van de voeding tot EC 1,2-1,6 en vul deze aan met 1 à 2 Tabzz in de laatste drie weken van de bloei voor de week van spoelen met water. Gebruik geen PK 13-14.

### Tabzz

